PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE HANTA

Se puede prevenir la infección por Hantavirus evitando cualquier tipo de contacto con ratones silvestres o sus excrementos y orinas, usando medidas adecuadas de protección. En lugares abiertos como nuestros campamentos, las medidas a tomar son las siguientes:

1. Evitar instalar las carpas a menos de 30 metros de sectores de arbustos, malezas o quilas.
2. Mantener la zona de campamento libre de desechos y escombros.
3. Ubicar los cúmulos de leña, paja u otros materiales a no menos de 30 metros de las carpas. Colocarlos sobre tarimas de 30 a 40 cms. de alto y con una falda de latón, para evitar que el ratón ascienda. Se debe mover este material periódicamente.
4. Mantener la basura en bolsas cerradas resistentes a ratones. Si no hay recolección de la basura, ésta debe ser enterrada diariamente en lugares alejados de la vivienda y cubierta cada vez con a lo menos 30 cms. de tierra.
5. Guardar la comida fuera del alcance de los roedores, especialmente en la noche. Procurar el uso permanente de recipientes herméticos.
6. Evitar dejar al alcance de los ratones envases con agua y mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua.
7. Potabilizar el agua y protegerla con bidones herméticos.
8. Tanto en las patrullas como en las manadas, lavar todos los platos y ollas inmediatamente después de las comidas. Si en la noche no se puede por la falta de luz, dejar las cosas guardadas en recipientes herméticos o bolsas cerradas.
9. Rociar el lugar de la carpa y las mesas con agua con cloro.
10. Si aparecen los síntomas del virus Hanta, vale decir, fiebre, dolores musculares intensos, tos, dificultad respiratoria, vómitos y/o dolor abdominal, acudir inmediatamente al Centro Asistencial más cercano, manifestando la posibilidad de que se haya contraído el virus.